

QUAN ARRIBA EL DEA

24 febrer, 2017



Símbol Internacional DEA

La desfibril·lació als 3-5 minuts de l'aturada pot produir taxes de supervivència de fins al 50-70%. Els ressuscitadors que fan la RCP, poden aconseguir una desfibril·lació precoç utilitzant un DEA d'accés públic o que estiguin en el lloc.

1.- Posi en marxa el DEA i segueixi les instruccions

Tan aviat com arribi el DEA (**D**esfibril·lador **E**xtern **A**utomàtic):

- Posa'l en marxa o demana a qui et pugui ajudar a fer-ho.

Alguns DEA es posaran en marxa de forma automàtica a l'obrir la tapa. En altres aparells cal que es premi el botó "OK".

- Treu la roba del pit de la víctima si és necessari, i col·loca els elèctrodes al pit despullat de la víctima.

Si hi ha un altre reanimador, s'ha de seguir la RCP mentre es col·loquen els dos elèctrodes al pit.

L'embolcall mostra sovint la posició correcta dels elèctrodes al pit. En molts casos, la posició s'indica també als mateixos elèctrodes.



2.- Que ningú toqui la víctima durant l'anàlisi

Assegura't que ningú toca la víctima mentre el DEA està analitzant el ritme cardíac.



2.1. Si està indicat, administrar una descàrrega

La seqüència és:

- Assegura't que ningú toca la víctima.
- Prem el botó de descàrrega com se li indica (els DEA totalment automàtics faran la descàrrega de manera automàtica).



2.2. Si la descàrrega no està indicada, continuï la RCP

Reinicia immediatament la RCP.

Segueix les instruccions verbals/visuals.

3.- Segueix la RCP com marca el DEA

La RCP es reinicia durant 2 minuts, seguidament el DEA analitzarà novament el ritme.

No interrompis la ressuscitació fins que:

- Un professional sanitari li digui que pot parar.
- La víctima faci senyals evidents de vida:
 - Es desperta.
 - Es mou.
 - Obre els ulls.
 - Respira amb normalitat.
- Ja no pots continuar perquè estàs esgotat.



4.- Si no respon, però respira amb normalitat

Si estàs segur que la víctima respira amb normalitat, però es manté inconscient, col·loca-la en posició lateral de seguretat.

És estrany que la RCP sola reiniciï el cor. A menys que estiguis segur que la persona s'ha recuperat, s'ha de

continuar amb RCP. Les nostres mans fan moure la sang del cor.

Signes de que la víctima s'ha recuperat:

- Es desperta.
- Es mou.
- Obre els ulls.
- Respira amb normalitat.

5.- RCP amb 2 interventors

El primer interventor iniciarà immediatament l'algoritme de SVB. El segon interventor trucarà al 112 tant aviat com sàpiga si la víctima respira o no, buscarà un DEA i al tornar col·locarà els elèctrodes.

Posteriorment , s'alternaran en fer 2 minuts de RCP.

Cada cop que el DEA analitza, o també en el cas no disposem d'un DEA, està recomanat que els interventors canviïn cada 2 minuts per prevenir l'esgotament, sense interrompre les compressions.