

APENDICITIS: TRACTAR-LA A TEMPS PER NO PERDRE LA VIDA

20 abril, 2021

L'apendicitis no és una patologia d'aquells que practiquem un esport com el futbol. La pot patir qualsevol i és molt important anar d'urgències a l'Hospital si tens els símptomes dels quals et parlarem en aquest article. Un apèndix és un petit tub buit amb forma de dit situat en l'extrem de l'intestí gruix. L'apendicitis és una inflamació que fa que el teu apèndix s'infla i s'infecti.

- L'apendicitis és un problema comú.
- Els símptomes més freqüents son dolor d'estómac, malestar estomacal i febre.
- Els metges tracten l'apendicitis amb cirurgia i antibiòtics. Si l'apendicitis no rep tractament ràpid, el seu apèndix pot trencar-se. Aquesta situació provoca una infecció en l'abdomen anomenada peritonitis. La peritonitis pot ser mortal, provocant una infecció generalitzada en els òrgans vitals.

Símptomes:

- Dolor que comença en la part central de la meitat superior de l'abdomen i es desplaça cap a la part inferior dreta d'aquest.
- Dolor que empitjora gradualment en hores, un dia o dos.
- Més dolor quan intentes moure't, tossir o quan algú pressiona el punt dolorit.
- Inapetència.
- Sensació de malestar estomacal i vòmit-
- Algunes vegades, febre de 37,7 a 38,3 °C.

En moltes persones i en nadons o nens, el dolor pot estar en tot l'abdomen, no només en la part inferior dreta.

En persones majors i en dones embarassades, el dolor pot ser menys intens, un dolor lleu però diferent, i l'àrea menys sensible. No per ser un dolor menys intens significa que no hàgim d'anar d'urgències a un hospital.

Si un apèndix es trenca:

- És possible que tingui menys dolor durant unes hores-
- Després el dolor s'aguditzarà.
- La infecció pot disseminar-se per l'interior del seu ventre (peritonitis).
- La infecció pot disseminar-se pel teu torrent sanguini i provocar que alguns dels teus òrgans deixin de funcionar normalment (septicèmia) i que la teva pressió arterial sigui perillosament baixa (xoc sèptic).

Diagnòstic:

Algunes vegades, els metges diagnostiquen l'apendicitis basant-se en els seus símptomes i en l'exploració clínica. Però, per regla general, també es fa:

- Radiografia.
- Ecografia.
- TAC, que és la prova definitiva.

Una vegada s'ha fet el diagnòstic, els metges tracten l'apendicitis:

- Una cirurgia per extirpar l'apèndix mitjançant una incisió oberta o una laparoscòpia.
- Antibiòtics per via intravenosa.

L'apèndix ja ha estallat en el moment de la cirurgia, i hauràs de romandre en l'hospital i rebre antibiòtics i líquids per via intravenosa durant més temps per evitar la septicèmia.