

ARTRITIS INFECCIOSA

27 setembre, 2021

L'artritis és la inflamació d'una articulació. Existeixen molts tipus d'artritis. L'artritis infecciosa és l'artritis causada per una infecció bacteriana en una articulació.

- La teva articulació pot infectar-se si altra infecció del teu organisme es propaga a l'articulació o bé si la teva articulació s'infecta durant un procediment quirúrgic o per una lesió.
- Per regla general, només es veu afectada una articulació

gran, com el genoll o l'espatlla.

- La teva articulació estarà inflada, envermellida i dolorida, i és possible que arribis a tenir febre.
- Si no es tracta, l'artritis infecciosa pot danyar la teva articulació.
- Els metges tracten la infecció amb antibiòtics i, a vegades, amb cirurgia per drena el pus de l'articulació.

¿Quina és la causa de l'artritis infecciosa?

Una articulació pot infectar-se per:

- Un tall, una mossegada o una ferida punxant sobre una articulació.
- Una infecció de la pell prop d'una articulació.
- Cirurgia en una articulació.
- Gonorrea que s'estén a les teves articulacions.

Seràs més propens a contraure artritis infecciosa sí:

- Portes una pròtesi articular.
- Utilitzes xeringues per injectar-te fàrmacs o drogues il·legals.
- Ets alcohòlic.
- Pateixes artritis reumàtica, artrosi u altres problemes articulars.
- Si tens un sistema immunitari debilitat.

¿Quins són els símptomes de l'artritis infecciosa?

La infecció articular pot començar ràpidament. La teva articulació està:

- Molt dolorida.
- Envermellida i calenta.
- Inflada i rígida.

A vegades, vostè presenta febre o calfreds.

En nadons i nens massa petits, com no parlen, pot ser difícil saber que els hi molesta, però els símptomes poden consistir en:

- No moure l'articulació infectada.
- Irritabilitat.
- Negar-se a menjar.
- Febre.
- Negar-se a caminar si l'articulació infectada està en una

cama.

¿Com poden saber els metges si pateixo artritis infecciosa?

- Li extrauran una mostra de líquid de la seva articulació amb una agulla per analitzar-la.

Per determinar la causa de la teva infecció articular, els metges poden sol·licitar:

- Anàlisi de sang.
- Anàlisi del líquid cefalorraquidi i d'orina.
- Radiografies, ressonància magnètica nuclear (RMN) o ecografia de l'articulació.

Tractament

- Antibiòtics o medicaments antifúngics.
- Extracció del pus de l'articulació amb una agulla o, a vegades, cirurgia.
- Una fèrula en l'articulació, seguida de fisioteràpia,
- Medicaments pel dolor de venda sense recepta, com aspirina o ibuprofèn.